

PREMEDIKASJON (SEDASJON)

Det gis ikke premedikasjon til barn:

- under 6 mnd
- med nedsatt bevissthet
- med aktiv gastroøsofageal reflux
- med pågående brekninger/oppkast
- med redusert almenntilstand
- med alvorlig søvnapnø/annen alvorlig apnø

Ref. Retningslinjer for behandling av akutte og prosedyrerelaterte smerter hos barn og ungdom. 2020. Intranasal.net. Preoperativ angst. NAForum 2015. Anxiolytic premedication for children. BJA 2020. BNF children.

Midazolam mikstur	p.o	< 25 kg	0,5 mg/kg p.o. Maksimal dose 15 mg. Gis 30 min før prosedyre.
Diazepam tabl.	p.o	> 25 kg	0,2 mg/kg p.o. Maksimal dose 10 mg. Gis 45-60 min før prosedyre.
Klonidin	p.o		3-5 µg/kg p.o. Maksimal dose 150 µg. Gis 1 time før prosedyre. Samme kontraindikasjoner som for dex.
Ketamin	I.M eller p.o		5 mg/kg umiddelbart før prosedyre.

Deksmedetomidin Dexdor®	I.N	< 1 år	2 µg/kg
		> 1 år	2-3 (4) µg/kg
			Døddrom i MAD Nasal 0,1 ml. Gis 45 min før prosedyre. ½-1 dose kan gjentas ved behov etter 45 min. Maks dose 200 µg. Barn < 1 år skal overvåkes av anestesipersonell. Kontraindikasjoner: se under.

Kontraindikasjoner:

- AV-blokk, alle grader dersom pasienten ikke har pacemaker
- Behandling med digitalispreparater (Digoxin, Lanoxin®)
- Ubehandlet hypertensjon og hypotensjon
- Sirkulatorisk truet pasient (f.eks. sepsis)
- Samtidig bruk av annen alfa-2-agonist (klonidin, Catapresan®) – risiko for bradykardi og langvarig sedasjon
- Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene