

# LOKALANESTESI

## LOKALANESTESI

Max bolus dosering	Uten adrenalin	Med adrenalin
Bupivacain (Marcain®)	2 mg/kg	2-(3) mg/kg
Lidokain (Xylocain®)	5 mg/kg	7 mg/kg
Ropivacain (Naropin®)	2 mg/kg	

### Hudinfiltrasjon:

Bupivacain 2,5 mg/ml 1 ml/kg (dersom ikke annen blokada brukt).

### Sacralblokada:

Bupivacain 1,7 mg/ml (2 deler Bupivacain 2,5 mg/ml + 1 del NaCl 9 mg/ml).  
Dosering: 1 ml/kg. Blokadens virketid: ca. 4-5 timer. Max volum 20-30 ml.  
Dersom man ønsker lengre virketid, kan det tilsettes klonidin 2 µg/kg.

### Toksisk reaksjon på lokalanestesi:

Symptomer sovende barn: Kramper, arrytmier, sirkulatorisk kollaps.

Intralipid® 200 mg/ml	i.v	1,5 ml/kg i.v over 1 min.  Dosen kan gjentas x 2. Videre infusjon 15 ml/kg/time.  Maks anbefalt kumulativ dose 12 ml/kg.
-----------------------	-----	---

Ref. Riktlinjer Astrid Lindgren 2019.

Håndtering av lokalanestesi forgiftning hos barn. NAForum 2015.